FICHA TÉCNICA

ÁCIDO BÓRICO

CONTROL DE CUCARACHAS

COMPOSICIÓN	Ácido bórico 96%
REGISTRO ISP	P-740/20
CLASE TOXICOLÓGICA	Clase III OMS, ligeramente peligroso
FORMATOS	Envase de 5 kg.

KNOCK DOWN	FLUSHING OUT	RESIDUALIDAD

ÁCIDO BÓRICO, insecticida polvo seco listo para aplicar, de amplio espectro de acción y prolongado efecto residual, estable en superficies porosas y absorbentes. Ideal para tratamientos en lugares donde la aplicación de insecticidas líquidos está limitada o prohibida como motores de maquinaria, calderas, ductos eléctricos, desagües, etc.

ÁCIDO BÓRICO, recomendado para el control residual de insectos rastreros, con excelentes resultados en tratamientos de cucarachas.

ÁCIDO BÓRICO, es estable en condiciones ambientales exigentes, pudiendo ser usado en interior, superficies absorbentes con presencia de polvo, expuesta a temperatura y humedad, sin perder su capacidad insecticida.

MODO DE ACCIÓN

ÁCIDO BÓRICO actúa a nivel estomacal, afectando el metabolismo normal del insecto. Además produce un efecto abrasivo sobre el exoesqueleto del insecto en contacto con el producto.

Para optimizar los resultados se recomienda una buena limpieza del área a tratar para eliminar los posibles factores que favorecen la presencia de cucarachas. **ÁCIDO BÓRICO** es de fácil manejo y aplicación, ideal para áreas sensibles. No es necesario retirar elementos u objetos en el momento de la aplicación.

DOSIS

FORMA DE APLICACIÓN	FORMA DE USO
Polvo listo para usar	Espolvorear 80 - 100 gr/m² en hendiduras y grietas en lugares de alta humedadalrededor de las cañería, debajo de los refrigeradores y motores, detrás de zócalos y orificios para el control y prevención de las infecciones de cucarachas.