

Características del producto:

Murin Facoum Block es un veneno para ratas y ratones listo para usar que contiene una sustancia anticoagulante activa, llamada Brodifacoum, efectiva contra ratones domésticos (*Mus musculus*), ratas grises (*Rattus Norvegicus*) y ratas negras (*Rattus Rattus*), y que los mata tras una simple ingesta. La formulación es un bloque parafinado que atrae a todas las especies de roedores incluidos en las características del producto. El producto no alarma ni hace sospechar a los demás miembros de la colonia.

Murin Facoum Block contiene una sustancia repelente para evitar que los niños lo ingieran por accidente. **Murin Facoum Block** puede usarse dentro o fuera de edificios, en zonas rurales o civiles, hogares, bodegas, garajes, tiendas, jardines y otras zonas exteriores.

Instrucciones y dosis:

El producto está listo para usar en las dosis que se indican más adelante. El cebo solo debe usarse en recipientes adecuados tales como cebaderas o tubos de PVC, protegidos del tiempo, de la ingestión de especies no objetivo y evitar vertirse al medio ambiente. Vigile la zona infestada y coloque los recipientes con el cebo cerca de los nidos, caminos y lugares donde haya mayor concentración de roedores. No toque el producto sin cubrirse las manos con guantes adecuados.

Las dosis recomendadas son:



Murin Facoum Block

Cebo raticida en bloques
parafinados listos para usar.

Fábrica de producción,

Vebi Istituto Biochimico s.r.l.
Via Desman 43
35010 Borgoricco (PD), Italia
Tel. (+39) 049 9337111
Fax (+39) 049 5798263
www.vebi.it

Reg. ISP N°: P-842/18

Aspecto, color y olor:

Sólido azul, mantenuilla

Composición

Brodifacoum (N°CAS 56073-10-0)	0,005 g
Denatonium benzoate	0,001 g
Sustancias apetecibles y coadyuvantes c.s.p	100 g

Target	Dosis	Lugar	Recomendación
Ratones	40 g. Por cada Punto de Cebo	Colocar los puntos de cebo cada 5 metros reduciéndolos a 2 metros en caso de infestaciones mayores (40 g. x 10 m ²)	Los ratones son muy curiosos y puede ser útil para la eficacia del tratamiento mover los cebos cada 2-3 días cuando los puntos de cebo se inspeccionan y/o reabastecen..
Ratas	60-100 g por cada punto de cebo	Colocar los puntos de cebo a una distancia de 10 m. y reducirlos a 5 para infestaciones mayores (60-100 g. x 10 m ²)	Los ratones son muy curiosos y puede ser útil para la eficacia del tratamiento mover los cebos cada 2-3 días cuando los puntos de cebo se inspeccionan y/o reabastecen.



Medidas de mitigación de riesgo:

Deje avisos a la vista cerca de la zona tratada. Compruebe el cebo de los recipientes todas las semanas y sustitúyalos cuando se los hayan comido. Realice controles frecuentes para retirar cualquier roedor muerto y deshágase de él enterrándolo a buena profundidad y en lugar seguro. No lo tire en cubos de basura ni en vertederos. Lleve puestos siempre guantes adecuados cuando manipule animales muertos. No use el recipiente vacío para otros fines ni lo deje tirado en cualquier sitio; eliminarlo o desecharlo de acuerdo con la legislación vigente. Este producto no es para uso permanente, planifique periodos de tratamiento para seis semanas de duración como máximo. Al final del tratamiento recoja los recipientes y elimine cualquier cebo restante de acuerdo a la legislación vigente