

## Características del producto:

**Murin Facoum Cebo blando** es un cebo raticida listo para el uso a base de Brodifacoum, eficaz contra los ratones y las ratas incluso después de una sola ingestión. La particular formulación en pasta blanda, grasosa pero no pegajosa, resultado del contenido de ingredientes especiales como las semillas de girasol, y se ha desarrollado para obtener la máxima eficacia con todas las especies de roedores anteriormente indicadas incluso en caso de fuerte competición alimenticia. El producto no alerta y no despierta sospechas en los otros componentes de la población de roedores. La muerte se produce unos días después de la ingestión, normalmente 4-10.

**Murin Facoum Cebo blaco** contiene una sustancia amarga destinada a prevenir la ingestión accidental por parte de los niños. **Murin Facoum Cebo blando** puede utilizarse en el interior y el exterior de viviendas urbanas y rurales, bodegas, garajes, trasteros y zonas de depósitos de desechos. Para utilizar en el interior, colocar cajas cebaderas en las orillas de murallas, en rincones o detrás de muebles de fácil inspección o control, identificando los lugares donde se congregan.

## Instrucciones, modalidades de uso y dosis:

El producto está listo para el uso y tiene que utilizarse según las dosis que se indican abajo. Cuando el producto se utiliza en cubetas monodosis, cuando se vayan a colocar, cortar la película de protección superior. El cebo raticida se tiene que introducir en un envase apropiado, protegido de los agentes atmosféricos, de la ingestión accidental por parte de niños y especies que no sean el objetivo y de la dispersión en el medio ambiente.

Colocar las cebaderas con el cebo por los recorridos de los roedores, en las madrigueras, cerca de donde comen, en los lugares donde su presencia es mayor y sobre todo donde haya heces frescas. Evitar tocar el producto con las manos descubiertas y utilizar los guantes apropiados.

El producto es eficaz contra: el ratón común (*Mus musculus*), la rata gris (*Rattus norvegicus*) y la rata negra (*Rattus rattus*).



### Murin Facoum Pasta

Cebo raticida listo para el uso en pasta fresca,

### Fábrica de producción,

Vebi Istituto Biochimico s.r.l.  
Via Desman 43  
35010 Borgoricco (PD), Italia  
Tel. (+39) 049 9337111  
Fax (+39) 049 5798263  
www.vebi.it

### Reg. ISP N°: P-843/18

### Aspecto, color y olor:

Sólido azul, mantequilla.

### Composición

Brodifacoum (N°CAS 56073-10-0)	0,005 g
Denatonium benzoate	0,001 g
Sustancias apetecibles y coadyuvantes c.s.p	100 g

- **Para infestaciones de ratas** utilizar cebaderas con hasta 200 g de cebo. Colocar estas cebaderas a una distancia de 10 m y reducirlos a 5 para infestaciones mayores (60-200 g x 10 m<sup>2</sup>). No mover ni interferir en los puntos de cebo durante varios días después de haber colocado los cebos. Si no hay signos de actividad después de 7-10 días mover las cebaderas a un área de mayor actividad

- **Para ratones** utilizar 20-40 g por cada cebadera. Colocar las cebaderas cada 5 metros reduciéndolos a 2 metros en caso de infestaciones mayores (40 g x 10 m<sup>2</sup>). Los ratones son muy curiosos y puede ser útil para la eficacia del tratamiento mover los cebos cada 2-3 días cuando los puntos de cebo se inspeccionan y/o reabastecen.

Si se ha consumido rápidamente todo el cebo, en un área determinada, aumentar el número de puntos de cebo en esa zona. Generalmente es más eficiente utilizar un mayor número de puntos de cebo respecto a un número menor con más cantidad de cebo. Los puntos de cebo con mayor cantidad de producto aumentan el riesgo para animales salvajes y que no son el objetivo.



### **Medidas de mitigación de riesgo:**

Señalar de la forma adecuada la zona del tratamiento. Eliminar lo antes posible a los animales muertos y según las normas previstas. El producto no está destinado al uso permanente, organizar los tratamientos de forma que duren 6 semanas como máximo. Al final del tratamiento quitar los envases y eliminar los cebos restantes según las normas vigentes.